

定期の予防接種 一覧（１）

接種種別		接種する年齢 (法で決められた年齢)	望ましい時期	接種回数	接種方法	注意事項
ヒブ ワクチン	初回 接種	２ヵ月～５歳の 誕生日の前日まで	生後２ヵ月～７ヵ月 の誕生日の前日まで	３回	２７日（医師が必要と認めた場合には２０日）以上、標準的には２７日（医師が必要と認めた場合には２０日）から５６日までの間隔において接種・計３回。 ただし、初回２回目及び３回目の接種は、生後１２ヵ月までに接種することとし、それを超えた場合は行わない。 追加は接種可能だが、初回接種に係る最後の注射終了後２７日（医師が必要と認めた場合には２０日）以上間隔を空けて１回接種。	・乳幼児の化膿性髄膜炎等の発症予防 ・接種開始が７ヵ月の前日まで 計４回接種 ・接種開始が生後７ヵ月から１２ヵ月までの前日まで 計３回接種 初回接種：２７日（医師が必要と認めた場合には２０日）以上、標準的には２７日（医師が必要と認めた場合は２０日）から５６日までの間隔において接種・計２回 追加接種：初回接種に係る最後の注射終了後７ヵ月以上、標準的には７ヵ月から１３ヵ月までの間隔において１回接種。ただし、初回２回目の接種は、生後１２ヵ月までに接種することとし、それを超えた場合は行わない。 追加は接種可能だが、初回接種に係る最後の注射終了後２７日（医師が必要と認めた場合には２０日）以上間隔を空けて１回接種
	追加 接種		初回接種終了後 ７～１３ヵ月の間	１回	初回接種に係る最後の注射終了後、７ヵ月以上、標準的には７ヵ月から１３ヵ月までの間隔において１回接種。	・接種開始が１歳以上５歳の誕生日の前日まで：１回接種のみ ・不活化ワクチン
小児 肺炎球菌 ワクチン	初回 接種	２ヵ月～５歳の 誕生日の前日まで	生後２ヵ月～７ヵ月 の誕生日の前日まで	３回	２７日間以上間隔を空けて接種・計３回。（生後２４ヵ月まで、標準的には生後１２ヵ月までに３回接種。ただし、生後１２ヵ月を超えて２回目を接種した場合は、３回目は行わない。追加は接種可能。）	・乳幼児の肺炎等の発症予防 ・接種開始が７ヵ月の前日まで：計４回接種 ・接種開始が生後７ヵ月～１２ヵ月の誕生日の前日まで：計３回接種 初回接種：２７日以上間隔を空けて２回接種 （生後２４ヵ月まで、標準的には生後１２ヵ月までに） 追加接種：初回接種終了後６０日間以上空けて１歳を過ぎて１回接種。 ただし、生後２４ヵ月を超えた場合は、２回目は行わない。 追加接種は可能。
	追加 接種		１歳 ～１歳３ヵ月の間	１回	初回３回目から６０日間以上の間隔を空けて、１歳になってから１回接種。	・接種開始が１歳～２歳の誕生日の前日まで 計２回接種 ６０日間以上の間隔を空けて２回接種 ・接種開始が２歳～５歳の誕生日の前日まで １回接種のみ ・不活化ワクチン
Ｂ型肝炎		１歳の誕生日の 前日まで	生後２ヵ月 ～９ヵ月	３回	１回目の接種から２７日以上あけて２回目を接種。 １回目の接種から１３９日以上（２０週以上）あけて３回目を接種。	・Ｂ型肝炎の予防 ・不活化ワクチン
ロタ ウイルス	ロタ リックス	出生６週０日後から２４週 ０日後まで	初回接種については、 生後２ヵ月に至った日 から出生１４週６日後 までの間	２回	１回目の接種から２７日以上あけて２回目を接種。	・ロタウイルス胃腸炎の重症化予防
	ロタ テック	出生６週０日後から３２週 ０日後まで		３回	１回目の接種から２７日以上あけて２回目を接種。 ２回目の接種から２７日以上あけて３回目を接種。	・経口生ワクチン
４種混合 (DPT-IPV) ・ジフテリア ・百日咳 ・破傷風 ・不活化ポリオ	１期 初回	生後２ヵ月から ９０ヵ月（７歳半）の 誕生日の前日まで	生後２ヵ月 ～１２ヵ月	３回	２０日間以上間隔を空ける。 標準的には５６日までの間に接種・計３回。	・ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオの予防
	１期 追加		１期初回３回目終了後 １２ヵ月～１８ヵ月の 間に１回	１回	初回接種終了後６ヶ月以上空ける。 標準的には１２ヶ月から１８ヶ月の間に接種。	・１期初回の接種は左右交互に行う ・不活化ワクチン

定期の予防接種 一覧（２）

接種種別		接種する年齢 (法で決められた年齢)	望ましい時期	接種回数	接種方法	注意事項
ＢＣＧ		生後から１歳の 誕生日の前日まで	生後５ヵ月～８ヵ月	１回		・結核の予防 ・生ワクチン
水痘	１回目	生後１２ヵ月から ３歳の誕生日の前日まで	生後１２ヵ月 ～１５ヵ月	１回		・水痘（水ぼうそう）の予防 ・生ワクチン
	２回目		１回目終了後 ６～１２ヶ月の間	１回	１回目接種終了後３ヶ月以上間隔を空ける。 標準的には６ヶ月～１２ヶ月の間に接種。	
麻しん・ 風しん混合 (MR)	１期	生後１２ヵ月から 生後２４ヵ月の 誕生日の前日まで	生後１２ヵ月以降で きるだけ早めに	１回		・麻しん（はしか）、風しんの予防 ・生ワクチン
	２期	５歳から７歳未満で 小学校入学前の１年間 (年長組にあたる年の ４月１日～３月３１日)	年長児になったら 早めに	１回		
日本脳炎	１期 初回	生後６ヵ月から９０ヵ月 (７歳半)の誕生日の前日 まで	３歳	２回	６日間以上間隔を空ける。 標準的には２８日までの間に接種・計２回。	・日本脳炎（ウイルス性の急性脳炎）の予防 ・不活化ワクチン
	１期 追加	生後６ヵ月から９０ヵ月 (７歳半)の誕生日の前日 まで（１期初回終了後おお むね１年後）	４歳（１期初回終了後 おおむね１年後）	１回	１期初回２回目終了後６ヶ月間以上間隔を空ける。 標準的にはおおむね１年後に１回接種。	
	２期	９歳～１３歳の 誕生日の前日まで	９歳	１回		
２種混合 (DT) ・ジフテリア ・破傷風	２期	１１歳から１３歳の 誕生日の前日まで	１１歳	１回		・ジフテリア・破傷風の予防 ・不活化ワクチン
HPV ワクチン (子宮頸がんワク チン)	２価 ワクチン (サーバ リックス)	１２歳となる日の属する年 度の初日から １６歳となる日の属する年 度の末日までの間にある女 子 (小学校６年生から高校１ 年生の女子)	１３歳となる日の属す る年度の初日から当該 年度の末日までの間 (中学１年生の間)	３回	１回目の接種から、１か月の間隔をおいて２回目の 接種をする。 １回目の接種から、６か月の間隔をおいて３回目の 接種をする。	・子宮頸がんの予防 ・不活化ワクチン ・市から個人通知します。
	４価(ガー タシル) ９価(シル ガード)				１回目の接種から、２か月の間隔をおいて２回目の 接種をする。 １回目の接種から、６か月の間隔をおいて３回目の 接種をする。	