

定期の予防接種 一覧（１）

小児肺炎球菌ワクチン		乳幼児の肺炎等の発症予防	不活化 ワクチン
接種種別	接種する年齢 (法で決められた年齢)	望ましい時期	接種回数
初回接種	2ヵ月から5歳の誕生日の前日まで	生後2ヵ月から7ヵ月の誕生日の前日まで	3回
追加接種		1歳から1歳3ヵ月の間	1回
接種方法			
○初回接種 27日間以上間隔を空けて接種・計3回。(生後24ヵ月まで、標準的には生後12ヵ月までに3回接種。ただし、生後12ヵ月を超えて2回目を接種した場合は、3回目は行わない。追加は接種可能。)			
○追加接種 初回3回目から60日間以上の間隔を空けて、1歳になってから1回接種。			
注意事項			
・接種開始が7ヵ月の前日まで：計4回接種 ・接種開始が生後7ヵ月から12ヵ月の誕生日の前日まで：計3回接種 初回接種：27日以上の間隔を空けて2回接種(生後24ヵ月まで、標準的には生後12ヵ月までに) 追加接種：初回接種終了後60日間以上空けて1歳を過ぎて1回接種。ただし、生後24ヵ月を超えた場合は、2回目は行わない。追加接種は可能。 ・接種開始が1歳から2歳の誕生日の前日まで：計2回接種 60日間以上の間隔を空けて2回接種 ・接種開始が2歳から5歳の誕生日の前日まで：1回接種のみ ・15価ワクチンもしくは20価ワクチンを使用。			
B型肝炎		B型肝炎の予防	不活化 ワクチン
接種種別	接種する年齢 (法で決められた年齢)	望ましい時期	接種回数
初回接種	1歳の誕生日の前日まで	生後2ヵ月から9ヵ月	3回
接種方法			
1回目の接種から27日以上あけて2回目を接種。 1回目の接種から139日以上(20週以上)あけて3回目を接種。			
ロタウイルス		ロタウイルス胃腸炎の重症化予防	経口生 ワクチン
接種種別	接種する年齢 (法で決められた年齢)	望ましい時期	接種回数
ロタリックス	出生6週0日後から24週0日後まで	初回接種については、生後2ヵ月に至った日から出生14週6日後までの間	2回
ロタテック	出生6週0日後から32週0日後まで		3回
接種方法			
○ロタリックス 1回目の接種から27日以上あけて2回目を接種。 ○ロタテック 1回目の接種から27日以上あけて2回目を接種。 2回目の接種から27日以上あけて3回目を接種。			
5種混合(DPT-IPV-Hib)		ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ、 乳幼児の化膿性髄膜炎等の発症予防	不活化 ワクチン
接種種別	接種する年齢 (法で決められた年齢)	望ましい時期	接種回数
1期初回	生後2ヵ月から90ヵ月(7歳半)の 誕生日の前日まで	生後2ヵ月から12ヵ月	3回
1期追加		1期初回3回目終了後 6ヵ月から18ヵ月	1回
接種方法			
○1期初回 生後2ヵ月から7ヵ月までに接種を開始し、20日から56日までの間隔をおいて3回。 ○1期追加 初回接種終了後から6ヵ月から18ヵ月までの間隔をおいて1回。			
注意事項			
・「5種混合ワクチンの接種」と「4種混合ワクチン+ヒブワクチンの接種」のどちらかのみ。 ※4種混合ワクチンとヒブを接種する場合は、予診票を綴っておりませんので、市健康増進課へお問い合わせください。			
BCG		結核の予防	生ワクチン
	接種する年齢(法で決められた年齢)	望ましい時期	接種回数
	生後から1歳の誕生日の前日まで	生後5ヵ月から8ヵ月	1回

定期の予防接種 一覧（２）

水痘		水痘（水ぼうそう）の予防	生ワクチン
接種種別	接種する年齢 (法で決められた年齢)	望ましい時期	接種回数
1 回目	生後 1 2 ヶ月から 3 歳の誕生日の 前日まで	生後 1 2 ヶ月から 1 5 ヶ月	1 回
2 回目		1 回目終了後、6 から 1 2 ヶ月の間	1 回
接種方法			
○ 2 回目 1 回目接種終了後 3 ヶ月以上間隔を空ける。標準的には 6 ヶ月～ 1 2 ヶ月の間に接種。			
麻しん・風しん混合（MR）		麻しん（はしか）、風しんの予防	生ワクチン
接種種別	接種する年齢 (法で決められた年齢)	望ましい時期	接種回数
1 期	生後 1 2 ヶ月から生後 2 4 ヶ月の 誕生日の前日まで	生後 1 2 ヶ月以降できるだけ早めに	1 回
2 期	小学校就学前の 1 年間 (年長組にあたる年の 4 月 1 日～ 3 月 3 1 日)	年長児になったら早めに	1 回
日本脳炎		日本脳炎（ウイルス性の急性脳炎） の予防	不活化 ワクチン
接種種別	接種する年齢 (法で決められた年齢)	望ましい時期	接種回数
1 期初回	生後 6 ヶ月から 9 0 ヶ月 (7 歳半) の誕生日の前日まで	3 歳	2 回
1 期追加	生後 6 ヶ月から 9 0 ヶ月 (7 歳半) の誕生日の前日まで (1 期初回終了後おおむね 1 年後)	4 歳 (1 期初回終了後おおむね 1 年後)	1 回
2 期	9 歳～ 1 3 歳の誕生日の前日まで	9 歳	1 回
接種方法			
○ 1 期初回 6 日間以上間隔を空ける。標準的には 2 8 日までの間に接種 計 2 回。 ○ 1 期追加 1 期初回 2 回目終了後 6 ヶ月間以上間隔を空ける。標準的にはおおむね 1 年後に 1 回接種。			
2 種混合（DT） ・ジフテリア、破傷風		ジフテリア・破傷風の予防	不活化 ワクチン
接種種別	接種する年齢 (法で決められた年齢)	望ましい時期	接種回数
2 期	1 1 歳から 1 3 歳の 誕生日の前日まで	1 1 歳	1 回
HPV ワクチン（子宮頸がんワクチン）		子宮頸がんの予防	不活化 ワクチン
接種種別	接種する年齢 (法で決められた年齢)	望ましい時期	接種回数
2 価ワクチン (サーバリックス) 4 価ワクチン (ガータシル) 9 価ワクチン (シルガード)	1 2 歳となる日の属する年度の初日 から 1 6 歳となる日の属する年度の 末日までの間にある女子 (小学校 6 年生から高校 1 年生の女子)	1 3 歳となる日の属する年度の初日から 当該年度の末日までの間 (中学 1 年生の間)	3 回 (2 回) ※ 1
接種方法			
○ 2 価ワクチン（サーバリックス） 1 回目の接種から、1 か月の間隔をおいて 2 回目 1 回目の接種から、6 か月の間隔をおいて 3 回目 ○ 4 価ワクチン（ガータシル） 1 回目の接種から、2 か月の間隔をおいて 2 回目 1 回目の接種から、6 か月の間隔をおいて 3 回目 ○ 9 価ワクチン（シルガード）※ 1 ・ 1 回目を 1 5 歳までに接種する場合（2 回） 1 回目の接種から、6 か月の間隔をおく ・ 1 回目を 1 5 歳になってから接種する場合（3 回） 1 回目の接種から、2 か月の間隔をおいて 2 回目 1 回目の接種から、6 か月の間隔をおいて 3 回目			
注意事項			
・市から個人通知します。			

